


マグコロールPの溶かし方と飲み方

溶かし方



- ①パウチの折り目を伸ばし、底のマチを広げます。
- ②容器のキャップを開封し、500 の目盛（約 500mL）まで水を入れてください。
- ③キャップを閉め、上下によく振って粉末を十分に溶かしてください。
水を入れたまま振らずに置いておくと、溶けなくなり白濁する場合があります。
- ④1800 の目盛（約 1800mL）になるまで水を追加し、混ぜてください。
平らな所に置いて 1800 の目盛まで水が入っていることを確認してください。

飲み方

○コップ 1 杯（約 200mL）ずつゆっくり飲んでください。

* 特にご高齢の方は、時間をかけてゆっくり飲んでください。

（途中で便意を催した時は、排便し、引き続き全部飲んでください。）

☆飲み始めて 30 分から 1 時間後に最初の排便が起こります。

☆その後数回（5～8 回）にわたって液状の排便があります。

☆排便回数とともに便の状態は固形→泥状便→黄色の水様便に変化していきます。にごりがなく、うすい黄色（尿の色くらい）になったら腸の中はきれいになっています。

☆もし全量飲まれてもうすい黄色の液にならなかった場合は、検査の前に申し出るようにしてください。



注 意

- (1) ガンコな便秘あるいは 2～3 日排便のない方は服用しないで連絡してください。
- (2) 服用中あるいは服用後に次の症状があらわれた場合には、服用を止めすぐに連絡してください。
 1. 気分が悪い
 2. 吐き気がする
 3. 吐いた
 4. お腹が痛い
 5. めまいがする
 6. 顔が青ざめる
 7. 寒気がする
 8. じんましんが出る
 9. 息苦しい
 10. 意識がぼんやりする
 11. 手足に力が入らない
 12. 皮ふが赤くなる
 13. 脈がおそくなる
 14. 血の混ざった便
- (3) マグコロールP を服用して排便がない場合にも、連絡してください。